



哪些人需要接受艾滋病
咨询和检测?



艾滋病高发
地区的孕产妇。

感染艾滋病
病毒的母亲所生
婴儿。



艾滋病病毒感
染者和病人的配偶、
子女及生活密切接
触者。



破损的皮肤粘
膜。不慎接触到被
艾滋病病毒感染的
血液、体液的人。



其他自愿接受艾滋病咨询检测的人员



VCT

艾滋病自愿 咨询检测

利人利己, 利家庭

全民动员, 大打一场防治
艾滋病的攻坚战



西林县疾病预防控制中心 宣
艾防科咨询电话: 0776-8685282



什么是艾滋病自愿咨询检测?

艾滋病自愿咨询检测 (VCT) 是指人们在经过咨询后对是否接受艾滋病检测做出选择和决定的过程, 整个过程是自愿和保密的。

咨询包括检测前咨询、检测后咨询、预防性咨询、支持性咨询和特殊需求咨询等。



凡自愿接受艾滋病咨询检测的中国内地公民均可得到免费的咨询和艾滋病病毒抗体初筛检测。



艾滋病自愿咨询检测有什么好处??

通过自愿咨询检测, 可以尽早发现疾病, 及时治疗, 保护好家人, 阻止传染扩大, 接受心理治疗、行为干预和生活指导提高生活质量; 自愿咨询对于健康者促进改变危险行为, 降低感染和预防传播。

到哪里进行咨询和检测?

西林县疾病预防控制中心提供免费咨询和艾滋病病毒抗体初筛检测服务。

具体情况可到西林县疾病预防控制中心咨询或打电话:
0776-8685282



哪些人需要接受艾滋病咨询和检测?



有过不安全性行为者 (如婚外性行为、多性伴、男男同性性行为等)。

与他人共用注射器静脉吸毒者。



既往有售卖血者 (到非法采血点卖血)。

怀疑接受过不洁输血, 使用过未经严格消毒的针具注射的人。





日常生活接触不传播艾滋病：蚊虫叮咬、握手、拥抱、咳嗽、打喷嚏、共餐、游泳、洗浴、一起劳动、工作、乘车、共用办公用品、劳动用具、被褥、钱币、电话、厕所等。

艾滋病临床表现

- ※反复而持续性的低热、腹泻；
- ※不明原因的体重下降；
- ※浸润性宫颈癌（年轻女性）；
- ※身体出现严重疱疹病毒感染；
- ※局部或全身性念珠菌、真菌感染及巨细胞病毒感染等。



手牵着手 心连着心

让 爱心
充满
红丝带

国家“四免一关怀”政策

向农村艾滋病病人和城镇经济困难的艾滋病病人免费提供抗艾滋病病毒治疗药品；
向接受艾滋病咨询、检测的人员免费提供咨询和初筛检测；
向感染艾滋病病毒的孕产妇免费提供预防艾滋病母婴传播的治疗和咨询；
对生活困难的艾滋病病人遗留的孤儿和感染艾滋病病毒的未成年人实行免费义务教育。
对生活困难的艾滋病病毒感染者，艾滋病病人及其家属给予生活救助，扶持有劳动能力艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，从事力所能及的生产和工作。

艾滋病自愿咨询检测

国家实施免费艾滋病自愿咨询检测，人人都可享受免费保密的艾滋病自愿咨询服务和初筛检测服务。
有过不安全性行为、共用注射器静脉吸毒、到非法采血点卖血、怀疑接受过不洁输血或注射的人及艾滋病高发地区的孕妇，应主动寻求艾滋病咨询检测。
全县各级医疗卫生机构可提供检测咨询，通过艾滋病自愿咨询检测，可得到更多关于艾滋病的医学指导，服务信息和心理支持与帮助，既有利于自己，又可采取积极措施，保护他人。



让世界充满爱
let the world filled with love



西林县疾病预防控制中心 宣
咨询电话：0776-8685282



多一份理解和关爱 少一份歧视和冷漠

什么是艾滋病

艾滋病是由艾滋病病毒引起的以人体免疫系统崩溃为特点的一种传染病。其病死率高，目前没有治愈的药物，但可以预防。

性病与艾滋病

患有其他性病的人更容易感染和传播艾滋病病毒。

性病引起的炎症或溃疡使皮肤粘膜破损，艾滋病病毒更容易进入体内。性病患者同时感染了艾滋病，会使病情加重，难以治疗。

艾滋病病毒感染者因身体抵抗力下降，更容易感染性病。

使用安全套预防性病艾滋病

正确使用质量合格的安全套可以大大降低感染艾滋病和性病的危险。

坚持每次性行为时全程使用，才能有效发挥安全套的防病作用。

除了正确使用安全套，其他避孕措施都不能有效预防艾滋病和性病。

艾滋病 传播途径

艾滋AIDS
一针相连



性传播

同性或异性接触，单次无保护性接触传播HIV的的机率为0.1%-1%，但同时患有其他性病，特别是伴有生殖溃疡的性病，可使单次性接触的危险性增加2-10倍无保护性性接触受感染的机率高於保护性性接触。

血液传播

输入被HIV污染的血液或血的液制品，或与静脉药瘾者，例如静脉注射毒品时，共用受HIV浸染的注射器。

母婴传播

感染HIV的孕妇对胎儿的HIV传播可发生在妊娠、分娩时和哺乳期。研究发现约1/2-2/3母婴传播在分娩前、后发生。

艾滋病的危害

对个人的危害

生理上讲，艾滋病病毒感染者一旦发展成艾滋病人，健康状况就会迅速恶化，患者身体上要承受巨大的痛苦，最后被夺去生命。心理、社会上讲，艾滋病病毒感染者一旦知道自己感染了艾滋病病毒，心理上会产生巨大的压力。另外，艾滋病病毒感染者容易受到社会的歧视，很难得到亲友的关心和照顾。

对家庭的危害

社会上对艾滋病病人及感染者的种种歧视态度会殃及其家庭，他们的家庭成员和他们一样，也要背负其沉重的心理负担。由此容易产生家庭不和，甚至导致家庭破裂。因为多数艾滋病病人及感染者处于养家糊口的年龄，往往是家庭经济的主要来源。当他们本身不能再工作，又需要支付高额的医药费时，其家庭经济状况就会很快恶化。有艾滋病病人的家庭，其结局一般都是留下孤儿无人抚养，或留下父母无人养老送终。

对社会的危害

艾滋病主要侵害那些年富力强的20-45岁的成年人，而这些成年人是社会的生产者、家庭的抚养者、国家的保卫者。艾滋病削弱了社会生产力，减缓了经济增长，人均出生期望寿命降低，民族素质下降，国力减弱，社会的歧视和不公正待遇将许多艾滋病病人及感染者推向社会，造成社会的不安全因素，使犯罪率升高，社会秩序和社会稳定遭到破坏。

对儿童的影响

艾滋病使千千万万的儿童沦为孤儿，使千万无辜儿童被迫承受失去亲人的痛苦，还要经常忍受人们的歧视、失学、营养不良以及过重的劳动负担。