

尽早治疗并治愈性病可减少感染艾滋病的危险。

共用注射器吸毒是传播艾滋病的重要途径,因此要拒绝毒品,珍爱生命。



尽量减少不必要的输血和注射,使用安全的血液和血制品。

关心、帮助和不歧视艾滋病病人及艾滋病病毒感染者是预防与控制艾滋病的重要方面。如果怀疑感染了艾滋病病毒,请向当地疾病预防控制中心咨询。



发生性行为时切记正确使用安全套



远离毒品 远离艾滋

艾滋病病毒在吸毒人群中传播十分迅速,这是因为静脉吸毒者常会共用没有经过消毒的注射器注射毒品,使带病毒的血液通过注射器从一个人进入另外一个人体内。所以,预防艾滋病毒通过吸毒相互传播,核心问题是杜绝共用注射器的现象。如果不幸沾染上了毒品,坚决戒毒是预防艾滋病的最有效措施,戒毒的同时还要远离吸毒的“朋友”。如果一时还不能戒除毒瘾,静脉注射毒品时要做到注射器和针头自己专用,决不能和其他人共用注射器或针头,这是预防吸毒传播艾滋病毒的最重要一道防线,因为这道防线距艾滋病仅一步之遥。



艾滋病防治

携手防疫抗艾
共担健康责任



行动起来,
向“零”艾滋迈进!

西林县卫生健康局 宣

自愿咨询检测电话: 0776-8661229



什么是艾滋病

艾滋病是英语“AIDS”中文名称，AIDS是获得性免疫缺陷综合征的英文缩写。它是由于感染了人类免疫缺陷病毒(简称HIV)后引起的一种致死性传染病。



什么是艾滋病病毒(HIV)



艾滋病病毒的医学名称为“人类免疫缺陷病毒”(英文缩写AIDS)，它侵入人体后破坏人体的免疫系统，使人体发生多种难以治愈的感染和肿瘤，最终导致死亡。



什么叫做“窗口期”？ “窗口期”有多长？

从受到艾滋病病毒感染，到体内产生出艾滋病病毒抗体，这一段时间称为窗口期。在窗口期，艾滋病病毒感染者的血液检测查不到艾滋病病毒抗体，结果呈阴性。窗口期的长短个体有差异，一般6周到6个月，平均为3个月。



艾滋病的传播途径只有三种

性接触传播

包括同性及异性之间的性接触。肛交、口交有着更大的传染危险。



性接触传播

血液传播

输入或注射被艾滋病病毒污染的血液或血制品,使用未经彻底消毒的非一次性注射用品及其它侵入人体的器械(如补牙、拔牙、穿耳洞、纹身的器械),共用注射器吸毒等,易感染艾滋病。




母婴传播

患有艾滋病或已感染艾滋病病毒的妇女可以通过妊娠、分娩和哺乳把艾滋病病毒传染给胎儿或婴儿。



艾滋病易感人群



哪些症状提示你可能患有艾滋病

- 1、持续广泛的淋巴结肿大，特别是颈、腋和腹股沟淋巴结。淋巴结肿大直径1厘米左右，坚硬、不痛、可移动，时间超过三个月。
- 2、数周以来不明原因发热和盗汗。
- 3、数周以来出现难以解释的严重疲乏。
- 4、食欲下降，2个月内体重减轻超过原体重的10%。
- 5、数周以来出现不明原因的慢性腹泻，呈水样，每日10次以上。
- 6、气促、干咳数周。
- 7、皮肤、口腔出现平坦或隆起的粉红、紫红色大斑点，不痛不痒。
- 8、咽、喉部出现白膜。男性阴部出现鳞屑性斑、痒。女性肛门瘙痒、阴道痒、白带多。
- 9、头痛、视物模糊。

当出现上面三个以上症状又有不洁性接触史时，应想到可能感染了艾滋病，应及时去医院检查。



人人都要预防艾滋病

洁身自爱、遵守性道德是预防经性途径传染艾滋病的根本措施。正确使用安全套不仅能避孕，还能减少感染艾滋病、性病的危险。