

除艾滋病外，目前我国重点防治的性病有梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣和生殖器疱疹

淋病

2

淋病是由淋球菌引起的、以泌尿生殖系统化脓性感染为主要表现的一种性病。

- 淋病以**性接触**为主要传播途径
- 患有淋病的孕妇分娩时其产道分泌物可**感染新生儿**引起淋菌性结膜炎

目 淋病的主要表现为男性的尿道炎和女性的宫颈炎、尿道炎。
其主要症状有尿频、尿急、尿痛、尿道口流脓或宫颈口、阴道口有脓性分泌物等。女性往往呈无症状感染。

be 治疗：头孢曲松和大观霉素是淋病治疗的首选药物，但不规范的治疗不仅不能治愈淋病，而且容易产生耐药。



3 生殖道沙眼衣原体感染

生殖道沙眼衣原体感染以男性尿道炎、女性宫颈炎最常见，但大多数感染者没有明显临床症状。

目 男性尿道炎表现为尿频、尿急、尿痛、尿道口稀薄黏液性分泌物。
女性表现为宫颈充血，宫颈口有黏液脓性白带；还可有尿急、尿频、尿痛等尿道感染症状；导致子宫内膜炎时，表现为持续性发热，月经过多，阴道不规则出血，下腹痛等。

be 治疗：四环素类、红霉素类等抗生素治疗有效。孕妇可用阿奇霉素或红霉素治疗。

除艾滋病外，目前我国重点防治的性病有梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣和生殖器疱疹

尖锐湿疣

4

目 尖锐湿疣是由人类乳头瘤病毒感染人体皮肤黏膜而引起的一种性病，发病后在生殖器及肛门部位出现**乳头状、菜花样的增生**。

be 尖锐湿疣以**性接触传播**为主，**皮肤接触**尖锐湿疣患者的病变部位及其污染的衣物和用品等亦有可能造成传播。**新生儿**可通过患有尖锐湿疣孕妇的产道而感染人类乳头瘤病毒。

be 治疗：一般利用外用药物或激光、冷冻等方法治疗，治疗后需定期复查以发现和处理复发。



5 生殖器疱疹

生殖器疱疹是由单纯疱疹病毒感染泌尿生殖器及肛门部位皮肤黏膜引起的一种性病。

引起生殖器疱疹的主要是单纯疱疹病毒II型，**几乎都是直接性接触传播**。

be 其主要症状是生殖器部位出现水疱、溃疡，并伴有疼痛感，严重的会出现全身发热、肌痛、头痛等症状。患生殖器疱疹的孕妇在分娩时如出现外生殖器部位水疱或皮疹时可**传染给新生儿**，严重者甚至导致新生儿死亡。

be 治疗：阿昔洛韦、伐昔洛韦、泛昔洛韦片等药物治疗能改善甚至消除临床症状，但可反复发作。

性病防治 · 知识要点 ·

KNOWLEDGE POINTS OF STD PREVENTION



湖口县疾病预防控制中心 宣

性病防治 核心信息



性病是以性接触为主要传播途径的一组传染病，其流行广泛，在我国传染病发病报告数中位居前列已成为重要的公共卫生问题和社会问题。

除艾滋病外，目前我国重点防治的性病有梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣和生殖器疱疹。



艾滋病



梅毒



淋病



生殖道沙眼衣原体感染



尖锐湿疣



生殖器疱疹

梅毒是一种危害大、传染性强的性病，通过性接触、血液和母婴三种途径传播，可引起神经、心血管等多系统损害，甚至危及生命。



性接触



血液传播



母婴传播

性病患者因生殖器局部皮肤黏膜的破损和炎症更容易感染艾滋病病毒，及时治愈性病可减少艾滋病的感染和传播。

性病是可以预防的，避免多性伴、杜绝不安全性行为是主要预防措施。



避免多性伴侣



杜绝不安全性行为

许多性病没有明显症状，大多数性病可以彻底治愈，关键是主动就诊、及时发现、尽早治疗。



主动就诊



及时发现



尽早治疗

到正规医疗机构接受规范诊疗，可以获得最佳的治疗效果并得到隐私保护。

预防控制性病是全社会的共同责任。



性病防治 知识要点



性病是以性接触为主要传播途径的一组传染病，其流行广泛，在我国传染病发病报告数中位居前列已成为重要的公共卫生问题和社会问题。

性病是我国发病人数最多的传染之一，近十几年来，我国性病发病率总体上呈逐年上升趋势，在卖淫嫖娼、多性伴、男男性同性性行为等人群中感染率较高。



性病对人体健康的损害是多方面的。感染性病后如不能及时发现和规范治疗，不仅可损害生殖器官导致不孕不育，也可传给胎儿或新生儿，有些性病还可造成人体多个器官损害，导致残疾甚至死亡。

性病可以造成家庭内传播。夫妇中的一方感染性病后，可通过性生活传给对方。少数情况下，家庭成员也可通过接触性病患者的分泌物污染的物品而被感染。



工作场所与公共场所的一般接触（如与性病患者的握手、拥抱、共同进餐等）不会传染性病。

性病可防可治。坚持安全性行为可预防性病；绝大多数性病经及早、规范治疗可治愈；病毒性性病经积极治疗可以临床治愈，但会复发。



人体对性病没有终生免疫能力，即使性病已治愈也可能再次感染。因此，性病治愈后仍需要预防性病。

除艾滋病外，目前我国重点防治的性病有梅毒、淋病、生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣和生殖器疱疹。

梅毒和淋病是我国法定报告传染病，生殖道沙眼衣原体感染、尖锐湿疣和生殖器疱疹是我国重点监测的性病。



1 梅毒

梅毒是由梅毒螺旋体引起的慢性、系统性疾病，临床上可分为：

• 隐性梅毒 • 一期梅毒 • 二期梅毒 • 三期梅毒

一期梅毒	一期梅毒表现为常常在感染后2周至4周内，在性接触的部位出现直径约1-2cm、圆形、红色、边缘隆起、基底较硬、无痛的溃疡，即“硬下疳”。
二期梅毒	二期梅毒表现为全身对称性红色皮疹，不痛不痒，多见于躯干、四肢、手掌或足底。
三期梅毒	三期梅毒会出现皮肤黏膜损害，典型病变为结节性梅毒疹和树胶肿。也可发生大脑、心血管、骨骼、眼睛等多个脏器的损害，严重者可导致残疾甚至死亡。
隐性梅毒	感染梅毒后也可长期没有明显症状，称为隐性梅毒。

治疗

苄星青霉素和普鲁卡因青霉素是梅毒治疗的首选药物，对青霉素过敏者可选四环素、红霉素等，孕妇及儿童要避免使用四环素类药物。

