

认识性病危害 提高防治意识

1、什么是梅毒？

梅毒是由梅毒螺旋体(TP)引起的慢性性传播疾病,潜伏期2 ~ 4周,长期进展可引起人体多系统多器官的损害,甚至危及生命。传播途径和艾滋病相似,通过性传播、血液传播和母婴传播。

2、哪些人应做梅毒抗体检测？

- 卖淫嫖娼者
- 多性伴者, 包括男男同性性行为者
- 既往经非正规途径献血、卖血、输入血液及血制品者
- 梅毒感染者的性伴及3岁以下的子女
- 孕产妇



3、如何预防梅毒感染？

- 洁身自爱, 避免多性伴。
- 采取安全性行为, 正确使用质量可靠的安全套。
- 平时注意个人卫生, 男性包皮过长者可做包皮环切。
- 不与他人共用注射器、针头。
- 尽量不输血或使用血制品。
- 有溃疡、皮疹等可疑症状时及时到正规医院就诊, 还要动员性伴接受检查和治疗, 并做好保护措施, 避免交叉感染。
- 梅毒感染的妇女, 在接受正规治疗前避免怀孕或哺乳, 若已经怀孕, 一旦发现梅毒感染, 即刻开始治疗。
- 一般日常生活不会传染性病, 但应做好家庭内部的清洁卫生, 防止对衣物等生活用品的污染。

早发现早诊治 消除麻风危害

1、麻风病是什么？

麻风病是由麻风杆菌引起的一种慢性传染病。95% 以上的人对麻风杆菌有正常抵抗力, 即使感染了麻风杆菌, 发病的比例也很低。

2、麻风病是如何传染的？

麻风病主要侵犯皮肤、周围神经等组织, 通过呼吸道飞沫或皮肤密切接触传播。麻风病的传染源主要是未经治疗的多菌型麻风病患者。

3、麻风病的主要表现有哪些？

早期主要是皮肤上出现不痛不痒的浅色或红色斑片, 可能伴有或不伴有感觉减退或丧失。病情逐渐发展后可能出现兔眼、歪嘴、爪形手、垂足、足底溃疡等畸残。

4、怀疑患有麻风病, 应该去哪里就诊？



主动去皮肤病防治院(所、站)等麻风病防治机构检查治疗, 或与当地疾病预防控制中心联系咨询。也可以先到医院皮肤科就诊, 根据情况转诊到前述机构确诊和治疗。

5、麻风病可以治愈吗？

早诊早治可避免畸残, 规范治疗可完全治愈。



S H A R E D H E A L T H



德州市疾病预防控制中心

AIDS 知艾防艾 共享健康

SCIENTIFIC PREVENTION AND CONTROL

1、正确认识艾滋病

艾滋病是一种危害大、死亡率高的严重传染病，目前不可治愈，无疫苗预防。

病毒侵入人体后破坏人体的免疫系统，需要终生服药治疗。若不坚持规范治疗，发病后病情发展迅速，易发生多种感染和肿瘤，最终导致死亡。

不能通过外表判断一个人是否感染了艾滋病病毒。

2、艾滋病是如何传播的？

艾滋病通过性接触、血液和母婴三种途径传播。性传播是最主要的传播途径，我国青年学生中艾滋病主要传播方式为男性同性性行为。

艾滋病病毒感染者及病人的血液、精液、阴道分泌物、乳汁、伤口渗出液中含有大量艾滋病病毒，具有很强的传染性。



日常生活接触不会传播艾滋病病毒

- 艾滋病不会经马桶圈、电话机、餐饮具、卧具、游泳池或浴池等公共设施传播。
- 咳嗽和打喷嚏不传播艾滋病。
- 蚊虫叮咬不会感染艾滋病。

3、艾滋病的检测与治疗

有过高危性行为、共用注射器吸毒、卖血、怀疑接受过不安全输血或注射的人，要主动进行艾滋病检测。

疾控中心、医院等机构均能提供保密的艾滋病咨询和检测服务。

可以使用 HIV 检测试纸进行自我检测，如果自检抗体阳性，及时到当地疾控中心或医院进一步咨询和检测。

感染后尽早接受抗病毒治疗。

目前我国对艾滋病感染者进行免费抗病毒治疗。规范的抗病毒治疗能有效抑制病毒复制，恢复免疫功能，延缓发病，延长寿命，提高生活质量。有效预防病毒传染配偶和性伴。



4、艾滋病如何预防？

- 固定性伴，避免非婚性接触和多性伴。
- 坚持每次正确使用安全套（使用安全套也不是 100% 预防）。
- 拒绝毒品、自尊自爱、遵守性道德、培养积极向上的生活方式是预防艾滋病的根本措施。
- 感染孕产妇及时采取医学手段阻止传染给婴儿。
- 避免不必要的输血和使用血制品。
- 不与他人共用未经消毒的剃须刀、牙刷或刮脸、穿耳、文身、文眉的器具。
- 暴露后 72 小时内尽早使用阻断药。
- 性病可增加感染艾滋病病毒的风险，怀疑自己患有性病时，要尽早检查、及时治疗，还要动员性伴接受检查和治疗。

5、法律法规

艾滋病病毒感染者和艾滋病病人应得到理解和关怀，反对歧视艾滋病病毒感染者和艾滋病病人。

得知感染艾滋病后应主动告知性伴或配偶。故意传播艾滋病的行为既不道德，也要承担法律责任。

