

传播途径

人群对丙肝病毒普遍易感，其传播途径与乙肝病毒类似，可通过以下方式传播：

血液传播

性接触传播

母婴传播

血液传播是最常见的传播途径，比如：使用非一次性注射器和针头、输血和血液制品、未经严格消毒的创伤性/侵入性诊疗操作（如口腔诊疗、针灸、内镜检查）、使用未经严格消毒的器械进行纹身/穿耳洞/修足。

吸毒人群感染丙肝的风险很高，尤其是通过静脉吸毒的人群。


未采取保护措施的高危性行为也容易感染丙肝。

一般日常生活接触（如：打喷嚏、近距离交谈、共同用餐），或者吸血昆虫叮咬，不会引起传播。

丙肝可以彻底治愈

丙肝直接抗病毒药物（Direct Anti-virus Agents, DAAs）的治愈率可达95%以上。

现在已经有八种DAAs通过政府谈判价格纳入医保报销目录，降幅可达80%以上，经医保报销后整个疗程自费部分约3000-11000元。目前全市已开设33家丙肝定点医院，若您丙肝抗体阳性，请尽快前往丙肝定点医院进行丙肝病毒核酸检测，若您核酸检测结果为阳性，请在丙肝定点医疗机构尽快接受规范抗病毒治疗。



早筛查 早发现
早诊断 早治疗



爱之浦东



疾控U健康



重大慢性传染病 健康处方

早预防

早发现

早治疗



上海市浦东新区卫生健康委员会 宣
上海市浦东新区疾病预防控制中心

肺结核，你听说过吗？

肺结核以前俗称“痨病”，是由结核分枝杆菌感染引起的慢性呼吸道传染病，所有人都有感染风险，老年人群尤其合并糖尿病者更易感染和发展为结核病。

多年来结核病位列全球死因前列，是名副其实的传染病“杀手”。中国结核病发病人数位列全球第三位，是结核病高负担国家。

根据估算，我国感染结核分枝杆菌的人口大约有2.3亿，人感染结核分枝杆菌后，大约5-10%的感染者会发展成为活动性结核病患者，临床表现主要有咳嗽、咳痰、痰中带血、咯血、乏力、发热、盗汗、体重减轻等。结核病的咳嗽症状往往持续时间较长，一般的止咳药、抗生素治疗无效，常用的抗生素中左氧氟沙星或者莫西沙星有抗结核作用，往往会掩盖咳嗽症状，不利于肺结核的早期发现。

得了肺结核怎么办？

得了结核病并不可怕，只要遵循“早期、联合、适量、规律、全程”的原则规范治疗，大约90%的患者都能够痊愈。

要树立治愈疾病的信心，在结核病定点医院积极配合医生完成规范治疗，社区医生也将全程协助你完成疗程。

怎么预防结核病？

改善居住环境卫生、勤开窗通风，公共场所佩戴口罩；均衡营养、睡眠充足、适量运动，提高免疫力；戒烟戒酒、定期体检。



什么是艾滋病？

艾滋病是一种危害大、死亡率高的传染病，目前不可治愈、无疫苗预防。

艾滋病离我们并不遥远

2018年我国报告新发现的60岁及以上艾滋病病毒感染者/艾滋病病人近3.2万例，呈现逐年增加的态势，老年病例95%通过异性性传播途径感染。

如何预防艾滋病经性途径传播？

- ◆ 避免发生不安全行为；
- ◆ 坚持每次正确使用质量合格的安全套。

注意：

- ▶ 绝不能通过生殖器外观判断对方是否感染了艾滋病病毒；
- ▶ 滥用路边摊无名“壮阳药”百害无益。

发生安全性行为，应主动寻求艾滋病检测，早发现早治疗对维护个人健康至关重要。



丙肝，你听说过吗？

丙肝，是丙型肝炎的简称，是由丙型肝炎病毒 (HepatitisCVirus, HCV) 引起的一种病毒性肝炎，部分患者可能会发展成慢性肝炎、肝硬化甚至肝癌。

据世界卫生组织估计，2019年全球有5800万人感染慢性HCV，30万人死于HCV感染引起的肝硬化或原发性肝细胞癌。



“隐形杀手”HCV

HCV感染早期通常不易察觉。感染后只有20%的患者会出现乏力、食欲减退、恶心、低烧、黄疸等急性肝炎症状；80%的患者无明显症状，在发现时患者的病情已进展为肝纤维化、肝硬化，甚至肝癌。

