

怀疑得了性病怎么办

1、多数性病可以彻底治愈，如果出现尿道分泌物异常、白带异常、皮疹、生殖器部位皮肤破溃、水泡等可疑症状时，应及时到正规医院检查治疗，不要自己买药乱治，也不要到没有诊治资质的私人诊所等机构就诊，更不要发生诊治延误。

2、性病感染可无自觉症状，有多性伴、不安全性行为者，应到医院检查。

3、早期发现、规范治疗可以提高疗效，减少并发症、后遗症的发生。



如果你想了解更多关于性病、艾滋病的信息请拨打
电话：59918254

嘉定区艾滋病免费检测咨询门诊

地 址：嘉定区洪德路1055号1号楼117室

检测时间：周一、四下午 13:30-16:00（节假日除外）



嘉定区公立医院性病门诊
地址及联系方式

嘉定区中心医院

地 址：嘉定区城北路1号

电 话：69987008-3057

嘉定区妇幼保健院

地 址：嘉定区高台路1216号

电 话：67070058

嘉定区中医医院

地 址：嘉定区博乐路222号

电 话：39921611

南翔医院

地 址：南翔镇众仁路495号

电 话：31274114

安亭医院

地 址：安亭镇和静路1060号

电 话：69070022-1305

江桥医院

地 址：江桥镇黄家花园路800号

电 话：67339028

上海中医药大学附属中医医院

地 址：马陆镇荣联路68号

电 话：56639828

海军军医大学第三附属医院

地 址：嘉定区墨玉北路700号

电 话：021-81887165

瑞金医院(嘉定院区)

地 址：嘉定区双丁路888号

电 话：67081110



上海市12320
卫生健康热线

性病防治





上海市嘉定区疾病预防控制中心
(上海市嘉定区卫生健康监督所)

什么是性病

性病是指以性行为作为主要传播途径的传染病，主要包括梅毒、淋病、尖锐湿疣、生殖道沙眼衣原体感染、生殖器疱疹、软下疳、性病淋巴肉芽肿、艾滋病等8种。

性病会危害人的身体、心理甚至下一代的健康，如不及时、规范治疗，会引发并发症和后遗症，如不孕、异位妊娠、早产、流产等。

梅毒

● 俗称花柳病，是由苍白螺旋体引起的一种慢性、全身性疾病。

● 潜伏期：一般为2~4周。

● 临床表现：一期梅毒主要表现硬下疳，多见于外生殖器部位，一般为单发，呈圆形或椭圆形潜在性溃疡，界限清楚，边缘略隆起，疮面清洁，无明显疼痛或触痛；二期梅毒皮损呈多样性，一般无自觉症状，可有瘙痒；三期梅毒多发生在感染2年以上，可引起皮肤黏膜、骨组织、心血管系统的严重损害，重者可危及生命；还有很多人感染梅毒后没有症状，称为“隐性梅毒”或“潜伏梅毒”。

淋病

● 是由淋球菌感染引起的。

● 潜伏期：一般在性接触后3~5天发病。

● 临床表现：男性一般有尿频、尿急、尿痛、尿道口有脓性或脓血性分泌物等，女性多症状不明显。淋病可致盆腔炎或输卵管闭塞及不育，如果孕妇感染淋病，不及时治疗，婴儿出生时可感染眼炎或失明。

尖锐湿疣

● 俗称椰菜花，是由人乳头瘤病毒（HPV）引起的皮肤黏膜良性增生性疾病。

● 潜伏期：一般为1~8个月，平均3个月。

● 临床表现：多发生于外生殖器，被动肛交者可发生于肛周、肛管和直肠，口交者可出现在口腔。皮损初期表现为局部多个丘疹，逐渐发展为乳头状、鸡冠状、菜花状或团块状的赘生物。

生殖器疱疹

● 主要是由单纯疱疹病毒（HSV）感染泌尿生殖器及肛周部位皮肤黏膜而引起的一种性病。

● 潜伏期：2~20日（平均6日）。

● 临床表现：初发为痛性丘疹、水泡，可相互融合并极易形成糜烂、溃疡。可反复发作，目前还没有办法彻底治愈。

生殖道沙眼衣原体感染

● 是由沙眼衣原体引起的一种性病。

● 潜伏期：平均1~3周。

● 临床表现：男性可有尿痛、尿道口有白色分泌物和尿道红肿等；女性可有尿频、尿急、尿痛及排尿困难，或仅有轻微红肿等。

性病是如何传播的

1、性接触传播：通过无保护的性接触传播。

2、血液传播：通过输入未经严格检测的血液及共用针具等传染。

3、母婴传播：部分性病可以通过孕期、分娩过程传播。

4、间接接触传播：也可以通过接触到被病人污染的物品如毛巾、马桶等传染。

性病和艾滋病的关系

1、艾滋病是性病的一种，与其他性病关系密切，性病患者更容易感染艾滋病病毒（简称HIV），患有性病将使感染HIV的危险性增加1.5~18.2倍。

2、几乎所有的性病都是通过性接触传染的，这也正是艾滋病的主要传播途径。

3、性病患者生殖器部位皮肤黏膜多有破损，为HIV侵入提供有利条件，使其更容易进入人体。

4、性病患者主要通过不洁性生活而感染，而其接触的性伴侣往往感染多种性病，也可能合并感染HIV。

5、治疗性病可以有效的控制艾滋病，能减少生殖道分泌HIV的含量从而降低HIV感染率。

预防性病的方法

1、洁身自爱、避免多性伴是预防性病的有效措施。

2、性生活时坚持正确使用安全套能有效预防性病。

3、性伴双方应该共同接受检查及治疗，避免交叉感染，在性病没有完全治愈前，应停止性生活。

4、为了下一代的健康，提倡婚前、产前检查艾滋病和梅毒，一旦发现感染应及时治疗，预防母婴传播的发生。

5、怀疑患了性病，应尽早到正规医院接受诊疗，避免延误。