

**“四免一关怀”政策**  
“FOUR FREES AND ONE CARE” POLICY



- 免费提供抗病毒药物；
- 免费提供咨询和初筛检测；
- 免费提供阻断药物及婴儿检测试剂；
- 艾滋孤儿免收上学费用；
- 将生活困难的艾滋病人纳入政府救助范围。

**世界艾滋病日**  
WORLD AIDS DAY

世界艾滋病日是12月1日  
世界艾滋病日的标志是红绸带。

红绸带标志的意义：红绸带像一条纽带，将世界人民紧紧联系在一起，共同抗击艾滋病，它象征着我们对艾滋病病人和感染者的关心与支持；象征着我们对生命的热爱和对和平的愿望；象征着我们要用“心”来参与预防艾滋病的工作。

**世界艾滋病日**  
AIDS



**生命至上  
健康平等  
终结艾滋**



耀州区疾病预防控制中心  
0919-6181911

AIDS



**预防艾滋病**

生命至上 健康平等 终结艾滋

远离艾滋 珍爱生命

L I F E F I R S T T H E A L T H E R E Q U I T Y E N D A I D S



# AIDS

## 什么是艾滋病？

WHAT IS AIDS

艾滋病 (AIDS) 全称为获得性免疫缺陷综合症。它是由艾滋病病毒 (HIV) 引起的一种目前尚无预防疫苗、又无有效治愈办法且病死率极高的传染病。艾滋病病毒 (HIV) 通过严重破坏人体免疫功能，造成人们的抵抗力极度低下，最终致全身衰竭而死。

## 相关法律法规有哪些？

WHAT ARE THE RELEVANT LAWS AND REGULATIONS

艾滋病病毒进入人体后的繁殖需要一定的时间。在开始阶段，感染者的免疫功能还没有受到严重破坏，因而没有明显的症状，我们把这样的人称为艾滋病病毒感染者。当感染者的免疫功能被破坏到一定程度后，其他病菌就会乘虚而入，这时，感染者就成为艾滋病患者了。从艾滋病病毒感染者发展到艾滋病患者可由数月甚至数年，一般为8-20年。

## 世界艾滋病的设立目的

PURPOSE OF WORLD AIDS DAY

1. 让人们都知道艾滋病在全球范围内是能够加以控制和预防的；
2. 让大家都知道，防止艾滋病很重要的一条就是每个人都要对自己的行为负责；
3. 唤起人们对艾滋病病毒感染者的同情和理解，因为他们的身心已饱受疾病的折磨，况且有一些艾滋病病毒感染者可能是被动的、无辜的；
4. 希望大家支持各自国家制定的防治艾滋病的规划，以唤起全球人民共同行动起来支持这方面的工作。

## 艾滋病的预防

AIDS PREVENTION

艾滋病患者要及时治疗；  
减少多性伴性交，危险性行为要带安全套；  
减少不必要输血，保证血制品安全；  
不与他人共用会暴露血液或体液的器械与用具；  
女性孕前做HIV检测，HIV阳性患者做母婴阻断。



## 发生暴露后如何预防用药

HOW TO USE PROPHYLAXIS AFTER EXPOSURE

发生暴露后，比如破损手指沾染艾滋病人的血液、同HIV感染者发生了无保护的性行为，可以使用暴露后预防用药。

### 服药周期

28天

### 服药种类

根据当地药品的可及性及医生评估后开具用药方案

### 服药效果

与起始用药时间密切相关，原则上不超过暴露后72小时。时间越早，效果越好。



## 日常接触不会传染艾滋病

DAILY CONTACT WILL NOT TRANSMIT AIDS

HIV主要存在于传染源的血液、精液、阴道分泌物、唾液、胸腹水、羊水和乳汁等体液中，日常生活接触不会感染病毒。



接吻、牵手、拥抱

共用餐具

蚊虫叮咬

## 艾滋病资源咨询检测

AIDS RESOURCE CONSULTATION AND TESTING

艾滋病资源咨询检测是及早发现感染者和病人的一项重要措施

艾滋病病毒感染者在发病前外表与正常人无异，绝不能从一个人外表是否健康来判断其是否感染艾滋病。

有过高危性行为、共用注射器吸毒，卖血、怀疑接受过不安全输血或注射的人以及艾滋病高发地区的孕产妇，要主动到市、区县疾病预防控制中心的艾滋病资源咨询检测 (VCT) 点进行免费咨询检测。

# 艾

## 艾滋病毒可以若干方式传播

DAILY CONTACT WILL NOT TRANSMIT AIDS

- 1、性接触：包括不安全的同性、异性和双性性接触
- 2、血液及血制品：包括共用针具静脉注射毒品、不安全规范的介入性医疗操作、纹身、剃须刀等
- 3、母婴传播：包括宫内感染、分娩时和哺乳传播