

# 珍爱生命



# 预防艾滋



## 艾滋病传播方式有几种

艾滋病的传播途径包括性接触传播、经血液及血制品传播、经母婴传播三个途径。1、性接触传播：如果发生不安全的性行为，会通过男性精液或女性的阴道分泌物进行传染。2、经血液及血制品传播：如果与感染艾滋病的患者共同使用针具静脉注射毒品，或者去不正规的医院进行医疗操作以及纹身等，有可能会感染艾滋病。3、经母婴传播：如果女性在怀孕期间患有艾滋病，通过胎盘或分娩时经阴道以及哺乳期通过乳汁会传染给孩子。艾滋病患者唯一的病因是HIV侵袭机体所造成感染发生，主要侵犯人体的免疫系统，从而出现感染或肿瘤。



## 艾滋病早期必有的症状有哪些

艾滋病早期的症状主要是病毒性感染的临床表现，但是艾滋病早期的症状并不明显，并且不是一定会出现的，所以容易被忽略。1. 感冒类症状：感染艾滋病之后，大部分人会出现伤风感冒类的症状，包括发热、头痛、乏力、盗汗以及咽痛等全身不适的表现。2. 淋巴结肿大：部分感染者还会出现淋巴结肿大的表现，主要是出现在头颈部、腋窝处以及颈后等部位，甚至会出现全身多处的淋巴结肿大。3. 其他症状：部分患者还会出现全身皮疹的现象，或者出现恶心、呕吐以及关节痛等症状。艾滋病早期的症状通常比较轻微，一般持续1-3周就可以自行缓解。如果怀疑感染上了艾滋病病毒，建议及时去医院进行相关的检查，一旦确诊为艾滋病后，就需要及早进行规范的抗病毒治疗。

## 性疾病有哪几种

常见的性疾病包括：1. 淋病：由淋病奈瑟菌引起的化脓性感染。2. 梅毒：慢性系统性的性传播疾病，通常用药物治疗。3. 尖锐湿疣：由人乳头状瘤病毒感染引起的疣体，可用手术治疗。4. 生殖器疱疹：由疱疹病毒感染引起的慢性复发疾病，可使用抗病毒药物治疗。5. 艾滋病：感染人类免疫缺陷病毒的疾病，主要治疗方法为抑制病毒复制和延缓病情进展。



隆阳区医疗保障局 宣